

1 Méthode d'Euler pour approcher la solution d'une équation différentielle

Déterminer la courbe de la solution de l'équation $f' = 3f + 5$ telle que $f(0) = 1$

1.1 L'idée mathématique

On a déjà vu qu'au voisinage d'un point, une courbe se confond avec sa tangente en ce point.

L'équation de la tangente à la courbe de f en a est : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$

Soit un point $(x_0; y_0)$ de la courbe voisin du point d'abscisse a , alors $x_0 = a + h$ avec h petit et $y_0 = f'(a)h + f(a)$.

De plus, on peut remplacer $f'(a)$ par $3f(a) + 5$ en utilisant l'équation différentielle.

On peut donc construire ainsi une suite de points $(x_n; y_n)$ avec $x_{n+1} = x_n + h$ et y_n calculé comme précédemment.

On doit fixer des conditions initiales : on utilise celles de l'énoncé $(x_0; y_0) = (0; 1)$

1.2 La mise en algorithme

Variables

x, y, h : réels

n : entier

Début de l'algorithme

Saisir x, y, n, h

Pour i allant de 1 à $n - 1$ **Faire**

$x \leftarrow x + h$

$y \leftarrow (3y + 5) * h + y$

 Afficher x, y

FinPour

```

1 def metheuler(x,y,h,n):
2     Ab=[x]
3     Or=[y]
4     for i in range(1,n):
5         Ab.append(Ab[i-1]+h)
6         Or.append((3*Or[i-1]+5)*h+Or[i-1])
7     return Ab , Or

```

2 Encadrement par dichotomie

2.1 La mise en algorithme

Variables

a, u, v, h : réels

Début de l'algorithme

Saisir a, b, h

Tant que $b - a > h$ **Faire**

| $m \leftarrow \frac{a + b}{2}$

| **Si** $f(a) \times f(m) \leq 0$ **Alors**

| | $b \leftarrow m$

| **Sinon**

| | $a \leftarrow m$

| **Finsi**

FinTantque

Sorties :

Afficher a, b