Enoncé pour les loups

Dans le plan complexe rapporté au repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on donne les points A et B d'affixe respectives $2 - i$ et $-2i$. A tout point M d'affixe z , on associe le point M' d'affixe z' définie par $z' = \frac{z - 2 + i}{z + 2i}$.

1. Déterminer E' si E a pour affixe $5 - 4i$

$$z_{E'} = \frac{5 - 4i - 2 + i}{5 - 4i + 2i} = \frac{3 - 3i}{5 - 2i} = \frac{(3 - 3i)(5 + 2i)}{(5 - 2i)(5 + 2i)} = \boxed{\frac{21 - 9i}{29}}$$

2. Déterminer l'ensemble des points M tels que $|z'| = 1$

$$|z'| = 1 \iff \left| \frac{z - 2 + i}{z + 2i} \right| = 1 \iff \frac{|z - 2 + i|}{|z + 2i|} = 1 \iff |z - 2 + i| = |z + 2i| \iff AM = BM \text{ donc } \boxed{\text{M est sur la médiatrice de [AB]}}$$

3. Déterminer l'ensemble des points M tels que $\arg(z') = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$

$\arg(z') = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \iff (\overrightarrow{BM}; \overrightarrow{AM}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. On cherche donc M tel que le triangle ABM soit rectangle en M. Donc M doit être sur le cercle de diamètre [AB].

Regardons si l'ensemble cherché est le cercle entier : $M \neq B$ car sinon le dénominateur de z' serait égal à 0.

$$M \neq A \text{ car } \arg(0) = 0 \neq \frac{\pi}{2}$$

Utilisons la figure pour mieux visualiser la situation :

Si on place M sur le demi-cercle resté noir, alors $(\overrightarrow{BM}; \overrightarrow{AM}) = -\frac{\pi}{2}$ donc l'ensemble cherché est le demi-cercle rose privé de A et de B.

4. Montrer que $|z' - 1| = \frac{\sqrt{5}}{|z + 2i|}$

$$|z' - 1| = \left| \frac{z - 2 + i}{z + 2i} - 1 \right| = \left| \frac{z - 2 + i - z - 2i}{z + 2i} \right| = \left| \frac{-2 - i}{z + 2i} \right| = \frac{\sqrt{5}}{|z + 2i|}$$

5. En déduire que si M est sur un cercle de centre B et de rayon 1 , alors M' est sur un cercle dont on précisera le centre et le rayon .

$$\begin{aligned} \text{M est sur le cercle de centre B et de rayon 1} &\iff BM = 1 \iff |z + 2i| = 1 \\ &\iff |z' - 1| = \sqrt{5} \iff IM' = \sqrt{5} \text{ avec I d'affixe } 1 . \end{aligned}$$

M' est donc sur le cercle de centre I et de rayon $\sqrt{5}$

Enoncé pour les lions

1. On cherche $z = a + ib$ tel que $z^2 = 8 - 6i$

- (a) Montrer que $a^2 - b^2 = 8$ et $ab = -3$

On doit avoir $z^2 = 8 - 6i \iff (a + ib)^2 = 8 - 6i \iff a^2 - b^2 + 2iab = 8 - 6i$ et en identifiant les parties réelles d'une part et les parties imaginaires d'autre part , on obtient les égalités cherchées .

- (b) Montrer que $a^2 + b^2 = 10$

$$z^2 = 8 - 6i \Rightarrow |z|^2 = |8 - 6i| \Rightarrow a^2 + b^2 = 10$$

- (c) En déduire z .

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 10 \\ a^2 - b^2 = 8 \\ ab = -3 \end{cases} \iff \begin{cases} 2a^2 = 18 \\ 2b^2 = 2 \\ ab = -3 \end{cases} \iff \begin{cases} a = \pm 3 \\ b = \pm 1 \\ ab = -3 \end{cases} \text{ donc } \boxed{z = 3 - i} \text{ ou } \boxed{z = -3 + i}$$

2. Déterminer z tel que $z^2 = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$ et en déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ et de $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$

On raisonne comme précédemment , on doit donc résoudre le système :

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 1 \\ a^2 - b^2 = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ ab = \frac{\sqrt{2}}{4} \end{cases} \iff \begin{cases} a^2 = \frac{\sqrt{2} + 2}{4} \\ b^2 = \frac{2 - \sqrt{2}}{4} \\ ab = \frac{\sqrt{2}}{4} \end{cases} \iff \begin{cases} a = \pm \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2} \\ b = \pm \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2} \\ ab = \frac{\sqrt{2}}{4} \end{cases} \text{ donc}$$

$$\boxed{z = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2} + i\frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}} \text{ ou } \boxed{z = -\frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2} - i\frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}}$$

On remarque que $\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} = e^{i\frac{\pi}{4}} = \left(e^{i\frac{\pi}{8}}\right)^2$ et on sait de plus que $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) > 0$ et de même $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right) > 0$ donc par ce qui précède : $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$

3. Déterminer z tel que $z^3 = e^{i\frac{\pi}{2}}$

Commençons par déterminer le module de z : $|z^3| = |e^{i\frac{\pi}{2}}| = 1 \iff |z|^3 = 1 \iff |z| = 1$

Déterminons maintenant un argument de z : $3\arg z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \iff \arg z = \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}$

Les solutions sont donc : $S = \left\{ e^{i\frac{\pi}{6}}; e^{i\frac{5\pi}{6}}; e^{i\frac{3\pi}{2}} \right\}$