Enoncé pour les loups

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ par $f(x) = \frac{x^3 + 2x^2}{x^2 - 1}$ et soit $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé d'unités graphiques 2 cm .

1. Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 3x - 4$

(a) Déterminer les limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$

$$g(x) = x^3 \left(1 - \frac{3}{x^2} - \frac{4}{x^3} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x^3} = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow \infty} 1 - \frac{3}{x^2} - \frac{4}{x^3} = 1 \text{ et puisque } \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

(b) Etudier les variations de g

$$g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1) \text{ et donc :}$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-	0
$g(x)$	$-\infty$	-2	-6	$+\infty$

(c) Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$.

Sur $] -\infty; 1[$ on a $f(x) < 0$. Sur $]1; +\infty[$, la fonction g est continue car dérivable , strictement croissante , et 0 appartient bien à l'intervalle $] -6; +\infty[$ donc par le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires , il existe un unique $\alpha \in]1; +\infty[$ tel que $g(\alpha) = 0$.

(d) Déterminer un encadrement de α à 10^{-2} près .

A la calculatrice , on obtient : $2,19 < \alpha < 2,2$

(e) Etudier le signe de g sur $\mathbb{R}$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$	-	0	+

2. (a) Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$

$$f(x) = \frac{x^3 \left(1 + \frac{2}{x}\right)}{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)} = \frac{x \left(1 + \frac{2}{x}\right)}{1 - \frac{1}{x^2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \frac{2}{x} = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{x^2} = 1 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

(b) Déterminer les limites de f en -1 et en 1

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^3 + 2x^2 = 3 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -1} x^3 + 2x^2 = 1 \text{ et on a :}$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$x^2 - 1$	+	0	-	+

Donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 - 1 = 0^-$ donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$.

De même : $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$.

(c) Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = \frac{xg(x)}{(x^2 - 1)^2}$

$$f'(x) = \frac{(3x^2 + 4x)(x^2 - 1) - 2x(x^3 + 2x^2)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x^4 - 3x^2 - 4x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{xg(x)}{(x^2 - 1)^2}$$

(d) En déduire le tableau de variations de f.

$(x^2 - 1)^2 \geq 0$ donc $f'(x)$ est du signe de $xg(x)$.

x	$-\infty$	0	α	$+\infty$
x	-	0	+	+
$g(x)$	-	0	-	+
$xg(x)$	+	0	-	+

Ce qui donne :

x	$-\infty$	-1	0	1	α	$+\infty$				
$f'(x)$	+		+	0	-		-	0	+	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$		$-\infty$	0	$-\infty$		$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

3. (a) Démontrer que $f(x) = x + 2 + \frac{x + 2}{x^2 - 1}$

$$x + 2 + \frac{x + 2}{x^2 - 1} = \frac{(x + 2)(x^2 - 1) + x + 2}{x^2 - 1} = \frac{x^3 + 2x^2}{x^2 - 1} = f(x)$$

(b) Etudier la position relative de $\mathcal{C}$ et de la droite D d'équation $y = x + 2$

Nous allons étudier le signe de $f(x) - (x + 2) = \frac{x + 2}{x^2 - 1}$ D'où :

x	$-\infty$	-2	-1	1	$+\infty$	
$x + 2$	-	0	+	+	+	
$x^2 - 1$	+	+	0	-	0	+
$f(x) - (x + 2)$	-	0	+	-	+	

On a donc la courbe de f au-dessus de D sur $] - 2; -1[\cup] 1; +\infty[$ et en dessous sur $] - \infty; -2[\cup] - 1; 1[$

(c) Tracer $\mathcal{C}$ et D

Enoncé pour les lions

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^3 - 4}{x^2 + 1}$ et soit $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé

1. Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 + 3x + 8$

(a) Dresser le tableau de variations de g

$$g'(x) = 3x^2 + 3 = 3(x^2 + 1) > 0$$

$$g(x) = x^3 \left(1 + \frac{3}{x^2} + \frac{8}{x^3} \right) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8}{x^3} = 0 \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \frac{3}{x^2} + \frac{8}{x^3} = 1 \quad \text{et}$$

puisque $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$

$$\text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$	+	
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

(b) Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$.

Sur $] -\infty; +\infty[$, la fonction g est continue car dérivable, strictement croissante, et 0 appartient bien à l'intervalle $] -\infty; +\infty[$ donc par le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique $\alpha \in] -\infty; +\infty[$ tel que $g(\alpha) = 0$.

(c) Déterminer un encadrement de α à 10^{-1} près.

$$-1,6 < \alpha < -1,5$$

(d) Etudier le signe de g sur $\mathbb{R}$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$	-	0	+

2. (a) Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$

$$f(x) = \frac{x^3 \left(1 - \frac{4}{x^3} \right)}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)} = \frac{x \left(1 - \frac{4}{x^3} \right)}{1 + \frac{1}{x^2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 1 - \frac{4}{x^3} = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{x^2} = 1 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

(b) Calculer $f'(x)$

$$f'(x) = \frac{3x^2(x^2 + 1) - 2x(x^3 - 4)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^4 + 3x^2 + 8x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{xg(x)}{(x^2 + 1)^2}.$$

(c) En déduire le tableau de variations de f .

$(x^2 + 1)^2 > 0$ donc $f'(x)$ est du signe de $xg(x)$:

x	$-\infty$	α	0	$+\infty$
x	-	0	-	+
$g(x)$	-	0	+	+
$xg(x)$	+	0	-	+

Ce qui donne :

x	$-\infty$	α	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$	$-\infty$	$f(\alpha)$	-4	$+\infty$

3. (a) Démontrer qu'il existe a, b, c et d réels tels que $f(x) = ax + b + \frac{cx + d}{x^2 + 1}$

Par identification :

$$f(x) = ax + b + \frac{cx + d}{x^2 + 1} \iff \frac{x^3 - 4}{x^2 + 1} = \frac{ax^3 + bx^2 + (a + c)x + b + d}{x^2 + 1}$$

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ a + c = 0 \\ b + d = -4 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = -1 \\ d = -4 \end{cases}$$

Donc $f(x) = x - \frac{x + 4}{x^2 + 1}$

(b) On appelle asymptote oblique à une courbe représentative d'une fonction f une droite d'équation $y = ax + b$ qui vérifie $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - (ax + b) = 0$. Montrer que $\mathcal{C}$ admet une asymptote oblique D .

$$f(x) - x = -\frac{x+4}{x^2+1} = \frac{1 + \frac{4}{x}}{x(1 + \frac{1}{x^2})} \text{ et } \lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \frac{4}{x} = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{x^2} = 1 \text{ donc}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - x = 0$$

La courbe $\mathcal{C}$ admet donc comme asymptote oblique la droite d'équation $y = x$

(c) Etudier la position relative de $\mathcal{C}$ et de la droite D

Etudions le signe de $f(x) - x = -\frac{x+4}{x^2+1}$ qui est du signe de $-x-4$ car le dénominateur est strictement positif.

La courbe de f est donc au-dessus de son asymptote sur $] -\infty; -4[$ et en-dessous sur $] -4; +\infty[$

(d) Tracer $\mathcal{C}$ et D